A.T.S.M
STAGE DE FORMATION
OLYMPIADES
MATHEMATIQUES TUNIS
MARS 2021

PARTIE : Géométrie :

Chokri Ben jedidia

Plan de la séance

- I. Puissance d'un point par rapport à un cercle**
- II. Théorème de Céva**
- III. Points cocycliques**
- IV. Théorème de Menelaus**
- V. Problèmes**

Puissance d'un point par rapport à un cercle

Définition et théorème

Définition : Soient C un cercle, O un point et D une droite passant par O , sécante à C en A et B . On appelle puissance du point O par rapport au cercle C , le produit algébrique $P=OA \times OB$

Théorème 1 : Si par un point on mène une sécante à un cercle, Le produit des mesures algébriques des deux vecteurs ayant pour origine le point O et pour extrémités les points communs au cercle et à la sécante est constant quand la sécante pivote autour du point O .

Exemple :

Soient $[AB]$ et $[CD]$ deux cordes d'un cercle $\mathcal{C}$.

Si les droites (AB) et (CD) se coupent en un point O , la connaissance des points O , A , B et C permet de construire le point D d'une manière unique.

Démonstration :

On distingue deux cas de figures.

- 1) Le premier cas : (O est extérieur au cercle)

Les angles $\widehat{DCA}$ et $\widehat{DBA}$, interceptent le même arc $\widehat{AD}$ donc ils sont égaux
Par conséquent les triangles OCA et OBD sont semblables

$$\begin{cases} \widehat{OCA} = \widehat{OBD} \\ \text{et} \\ \widehat{O} \text{ en commun} \end{cases}$$

On peut donc écrire :

$$\frac{OA}{OD} = \frac{OC}{OB}$$

On en déduit :

$$OA \times OB = OD \times OC$$

Cette relation s'écrit algébriquement de la façon suivante :

$$\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OD} \times \overrightarrow{OC}$$

Car les vecteurs $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}$ sont de même sens (arbitrairement choisis sur (AB))

De même les vecteurs $\overrightarrow{OD}$ et $\overrightarrow{OC}$ sont de même sens (arbitrairement choisis sur (DC)).

2) Le deuxième cas : (O à l'intérieur du cercle)

Les triangles OAC et OBD sont semblables.

Car

$$\begin{cases} \widehat{AOC} = \widehat{DOB} \text{ deux angles opposés par le sommet} \\ \widehat{DBA} = \widehat{DCA} \text{ interceptent le même arc} \end{cases}$$

Donc :

$$\frac{OA}{OD} = \frac{OC}{OB}$$

On en déduit :

$$OA \times OB = OC \times OD$$

Dans ce cas les vecteurs $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}$ sont de sens opposés

De même pour les vecteurs $\overrightarrow{OC}$ et $\overrightarrow{OD}$.

Algébriquement on a :

$$\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC} \times \overrightarrow{OD}$$

Conclusion : $\overrightarrow{OC} \times \overrightarrow{OD} = P$ est une constante avec $P = \overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}$.

Remarque :

- 1- $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}$ produit scalaire des vecteurs $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}$
- 2- Si $O \in \ell$ Alors $P = 0$.

Théorème 2 :

Si deux droites (AB) et (CD) se coupent en O, et si l'on a :

$$\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC} \times \overrightarrow{OD}$$

Alors les quatre points A, B, C et D sont sur un même cercle. On dit qu'ils sont cocycliques.

Démonstration :

Les deux droites sont sécantes, donc les points A, B et C ne sont pas alignés. Il existe donc un et un seul cercle circonscrit au triangle ABC, ce cercle coupe (OC) en un point D'.

D'après le théorème 1. $\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC} \times \overrightarrow{OD'}$

Or par hypothèse on a $\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC} \times \overrightarrow{OD}$

On en déduit : $\overrightarrow{OC} \times \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OC} \times \overrightarrow{OD'}$

Donc $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OD'}$ Les points D et D' sont confondus.

Théorème de Céva:

Soit ABC un triangle et P, Q, R trois points pris respectivement sur les droites (BC) , (CA) , (AB) . Alors les droites (AP) , (BQ) , (CR) sont concourantes si et seulement si on a :

$$\frac{BP}{PC} \cdot \frac{CQ}{QA} \cdot \frac{AR}{RB} = 1$$

le.....

théorème de Céva P7

Soit $\{T\} = (AP) \cap (BQ)$ et soit S le pt d'intersection des droites (TC) et (AB)

$\cos \alpha = \frac{d(B, (AP))}{BP} \quad T_{BHP}$
 $\cos \alpha = \frac{d(C, (AP))}{PC} \quad T_{CH'P}$

$\frac{BP}{PC} = \frac{h}{h'} = \frac{h \times AT}{h' \times AT} = \frac{[ATB]}{[CTA]}$

$\text{de m}^1 \quad \frac{CQ}{QA} = \frac{[BTC]}{[ATB]}$

$\frac{AS}{SB} = \frac{[CTA]}{[BTE]}$

$\frac{BP}{PC} \times \frac{CQ}{QA} \times \frac{AS}{SB} = \frac{[ATB]}{[CTA]} \times \frac{[BTC]}{[ATB]} \times \frac{[CTA]}{[BTC]} = 1.$

$(AP), (BQ)$ et (CR) sont concourantes ssi $R=S$
 ssi $\frac{AR}{RB} = \frac{AS}{SB} \quad \text{sse} \quad \frac{BP}{PC} \times \frac{CQ}{QA} \times \frac{AR}{RB} = 1.$

Coordonnées barycentriques théorème de Ceva (P_2)
dans le repère cartésien $(A, \vec{AC}, \vec{AB})$

$$A(0,0) ; C(1,0) ; B(0,1) ; P(k, -k+1) \\ (\vec{BP} = k\vec{BC})$$

$$R(0,r) ; Q(q,0) \\ \vec{CR} \begin{bmatrix} 0-1 \\ r \end{bmatrix}$$

$$(CR) : rx + y + d = 0 \quad R \in (CR) \Leftrightarrow d = -r \\ \vec{BQ} \begin{bmatrix} q-0 \\ 0-1 \end{bmatrix} \quad (CR) : rx + y - r = 0$$

$$(BQ) : x + qy - q = 0 \\ \vec{AP} \begin{bmatrix} k \\ -k+1 \end{bmatrix}$$

$$(AP) : (k-1)x + ky = 0 \\ \begin{cases} rx + y - r = 0 \\ x + qy - q = 0 \\ (k-1)x + ky = 0 \end{cases}$$

$$\text{ssi } \det \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0 \quad (AP), (BQ), (CR) \text{ sont} \\ \text{concurrentes en}$$

$$\text{c'èd} \begin{vmatrix} r & 1 & -r \\ 1 & q & -q \\ k-1 & k & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow r[qk] + k \times (r) \times (-1) + (k-1)q(r-1) = 0$$

$$\Leftrightarrow rk(q-1) + q(k-1)(r-1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{rk(q-1)}{(1-k)q \cdot (1-r)} = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{k}{1-k} \times \frac{q-1}{q} \times \frac{r}{1-r} = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{BP}{PC} \times \frac{CQ}{QA} \times \frac{AR}{RB} = 1 \quad \text{Th de Ceva}$$

Théorème de Ménélaus :

Soit ABC un triangle et P, Q, R trois points pris respectivement sur les droites (BC) , (CA) , (AB) . Alors les points P, Q, R sont alignés si et seulement si on a

$$\frac{BP}{PC} \cdot \frac{CQ}{QA} \cdot \frac{AR}{RB} = -1$$

théorème de Ménélaus. Pg

Soit S l'intersection des droites (PQ) et (AB)
 T l'intersection de la parallèle à (PQ) passant par C et de (AB)

d'après thales

$$\frac{PB}{PC} = \frac{BS}{ST} \quad , \quad \frac{CQ}{QA} = \frac{TS}{SA} \quad \frac{AR}{RB} = \frac{AS}{SB}$$

$$\frac{BP}{PC} \times \frac{CQ}{QA} \times \frac{AR}{SB} = \frac{BS}{ST} \times \frac{TS}{SA} \times \frac{AS}{SB} = -1$$

P, Q, R sont alignés ssi $\frac{AR}{RB} = \frac{AS}{SB}$ soit $R=S$

$h_1 = h(S, k_1) \quad | \quad h_2(T) = B$
 $h_2 = h(S, k_2) \quad | \quad h_2(A) = T$
 $h_3 = h(S, k_3) \quad | \quad h_3(B) = A$
 $h_1 \circ h_2 \circ h_3 = id_P \rightarrow k_1 k_2 k_3 = 1$

PROBLEME 1.

Soient Ω_1 et Ω_2 deux cercles qui se coupent en M et en N.

Soit Δ la tangente commune aux deux cercles, qui est plus proche de M que de N. Δ est tangente à Ω_1 en A et à Ω_2 en B.

La droite passant par M et parallèle à Δ rencontre Ω_1 en C et Ω_2 en D.

Soient E l'intersection des droites (CA) et (BD), P le point d'intersection des droites (AN) et (CD) et Q le point d'intersection des droites (BN) et (CD).
Montrer que $EP = EQ$.

PROBLEME 2.

Soient C et D deux points d'un demi-cercle de centre O.

La tangente en C (respectivement en D) au demi-cercle coupe la prolongation du diamètre de ce demi-cercle en B (respectivement en A).

On suppose de plus que les points A et B ne sont pas du même côté de O sur la prolongation du diamètre.

Soit E l'intersection des droites (AC) et (BD) et soit F le pied de la hauteur issue de E dans le triangle BEA.

Montrer que (EF) est la bissectrice de l'angle $\widehat{CFD}$

PROBLEME 3.

Soit ABC un triangle rectangle en C. Soit K le projeté orthogonal de C sur (AB).

La bissectrice de l'angle $\widehat{ACK}$ coupe le côté [AB] en E.

La parallèle à (EC) passant par B coupe (KC) en F.

Montrer que (EF) recoupe (AC) en son milieu.

PROBLEME 1.

Solution

Il suffit d'être logique, qualité qui permet de résoudre nombre d'exercices de géométrie : une chasse aux angles s'impose, et montre que $\widehat{ABE} = \widehat{CDE} = \widehat{MBA}$, la dernière égalité étant d'une importance capitale. De même, $\widehat{BAE} = \widehat{MAB}$. Ces égalités impliquent que M et E sont images l'un de l'autre par la symétrie par rapport à la droite (AB) . Les droites (ME) et (AB) sont orthogonales, puis les droites (ME) et (PB) sont orthogonales.

Il faut également savoir reconnaître les situations classiques : ici, en notant T l'intersection des droites (MN) et (AB) , il faut savoir que $TA = TB$ (cela se retrouve en calculant la puissance de T par rapport aux deux cercles : $TA^2 = TM.TN = TB^2$). Le théorème de Thalès montre alors que M est le milieu de $[PB]$. En somme, (ME) est la médiatrice de $[PQ]$. E est donc bien équidistant de P et de Q .

PROBLEME 2.

Problème 2:

Conjecture: (EF), (BC) et (AD) sont concourants

$\{P\} = (CB) \cap (AD)$ H projeté orth de P sur (BA)

M en Vus que $H = F$.

Mq (PH) (BD) et (AC) sont concourants en E.

$$\Leftrightarrow \frac{AH}{HB} \times \frac{BC}{CP} \times \frac{PD}{DA} = 1$$

or $PC = PD$ d'où il suffit:

$$\frac{AH}{HB} \times \frac{BC}{DA} = 1$$

on déduit $\frac{BH}{BC} = \frac{AH}{AD}$

PAH et OAD sont semblables et PBH et OBC sont semblables

$$\left\{ \begin{array}{l} OD \perp AD \\ PH \perp AH \end{array} \right. \text{ et } \widehat{OAD} = \widehat{HAD}$$

$$\boxed{\frac{AH}{AD} = \frac{HP}{OD}}$$

$$\boxed{\frac{BH}{BC} = \frac{HP}{CO}}$$

PROBLEME 3.

Solution . Soit D l'intersection de (EF) et de (AC) . Les trois points D , E et F sont ainsi alignés, et l'on se retrouve dans une configuration propice à utiliser le théorème de Menelaus, qui donne :

$$\frac{AD}{CD} \cdot \frac{CF}{FK} \cdot \frac{KE}{AE} = 1.$$

Il suffit ainsi de montrer que $\frac{CF}{FK} = \frac{AE}{KE}$. On cherche donc à exprimer les deux rapports d'une autre manière.

Une petite chasse aux angles permet d'obtenir que $BC = BE$, et le théorème de Thalès fournit $\frac{CF}{KF} = \frac{EB}{KB}$. D'où :

$$\frac{CF}{KF} = \frac{BC}{KB}.$$

D'autre part, dans le triangle ACK , (CE) étant bissectrice de l'angle $\widehat{ACK}$, $\frac{AE}{KE} = \frac{AC}{CK}$ (propriété à connaître absolument !). Puisque les triangles ACK et BCK sont semblables, on obtient finalement :

$$\frac{AE}{KE} = \frac{BC}{BK}.$$

En définitive, $\frac{CF}{KF} = \frac{AE}{KE}$, ce qui entraîne $AD = CD$.